

Généralités, abréviations

La conduite d'exploitation en production porcine est de plus en plus dictée par le marché et par la législation. C'est la raison pour laquelle il devient toujours plus important d'utiliser au mieux la marge de manœuvre disponible pour diminuer les coûts et ainsi tendre à une production porcine la plus professionnelle et la plus rentable possible. La check-list pour l'analyse de la production porcine permet de passer systématiquement en revue les différents domaines que sont la détention, l'alimentation, le management et l'élevage. Cette check-list est par conséquent un outil au service du conseiller et du détenteur de porcs pour mettre en évidence et profiter des possibilités inexploitées.

Plus le nombre de réponses affirmatives est élevé, plus l'exploitation est conduite de manière professionnelle et rentable.

Toutes les questions auxquelles la réponse est « non » ou « en partie » représentent un potentiel d'amélioration. Cochez la position qui convient dans la colonne de droite, et prenez les mesures appropriées à la situation.

Le respect des dispositions légales est considéré comme un pré-requis à l'utilisation de la check-list. Par conséquent, ces aspects ne sont pas explicitement passés en revue dans la check-list. Ceci concerne en particulier :

- la législation en matière de protection des animaux;
- la législation en matière de protection des eaux et de l'environnement;
- les prestations écologiques requises (PER);
- la législation autour du livre des aliments pour animaux;
- la liste des aliments (alimentation conforme au marché);
- le devoir de documentation en matière d'utilisation d'antibiotiques (journal des traitements, inventaire des médicaments vétérinaires);
- les programmes éthologiques SST et SRPA;
- les exigences des différents labels;
- les exigences AQ Viande Suisse.

Les points considérés généralement comme acquis (par ex. surface de l'aire de repos, largeur de la place à l'auge, aliments irréprochables) ne sont également pas passés en revue dans la check-list.

Domaines		Légende	
		Type d'expl.	Réponses
Détention	= 26 questions	EL	= Exploitation d'élevage
Alimentation	= 28 questions	EN	= Exploitation d'engraissement
Management	= 42 questions	NP	= Non pertinent
Elevage	= 33 questions	E	= Exact (oui)
Total	= 129 questions	PE	= Partiellement exact
		I	= Inexacte (non)
		M	= Mesures à prendre

CHECK – LIST

Pour une production porcine professionnelle et rentable

N°	Expl.		Domaine : détention							
	EL	EN		Critères, questions		NP	E	PE	I	M
1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Les systèmes de détention et les installations sont-ils utilisés correctement, de telle sorte que la propreté et l'hygiène sont garanties ?			<input type="checkbox"/>				
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	En cas de lots problématiques, est-ce que la chaîne infectieuse a été interrompue par un vide sanitaire accompagné d'un nettoyage à fond et d'une désinfection de la porcherie, et est-ce que le lot suivant était composé d'animaux garantis sains ?			<input type="checkbox"/>				
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Les locaux peuvent-ils être chauffés, de telle sorte que, pour tous les animaux lors de chaque phase de développement une température optimale peut être garantie ?			<input type="checkbox"/>				
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	La porcherie est-elle équipée d'une ventilation fiable munie d'un système de régulation de l'air entrant et sortant en état de marche ?			<input type="checkbox"/>				
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dans le cas d'une porcherie chauffée, est-ce que la température de l'air est maintenue à :			<input type="checkbox"/>				
			• local de mise bas	18 °C						
			• nids à porcelets :	3 premiers jours dès 3 jours	32 – 28 °C 28 – 22 °C					
6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	• porcelets sevrés en stalles d'avancement	26 – 24 °C		<input type="checkbox"/>				
			• truies gestantes et remontes	18 – 15 °C						
7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Est-ce que le box de mise bas est muni d'un nid à porcelets sec et sans courants d'air, permettant l'établissement d'un micro-climat ?			<input type="checkbox"/>				
8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	L'humidité relative se situe-t-elle généralement aux alentours de 60 – 80 % ?			<input type="checkbox"/>				
9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Les émanations de gaz nocifs dans la porcherie (ammoniac) restent-elles à un niveau acceptable ?			<input type="checkbox"/>				
10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Un siphon est-il installé entre la porcherie et la fosse à lisier ?			<input type="checkbox"/>				
11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Les différentes chambres de la porcherie peuvent-elles être nettoyées après chaque lot ?			<input type="checkbox"/>				
12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Les différentes chambres de la porcherie sont-elles désinfectées au moins 2 fois par année, ou lors de problèmes sanitaires ?			<input type="checkbox"/>				
13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Les éléments de caillebotis peuvent-ils être soulevés et nettoyés également sur leur face inférieure ?			<input type="checkbox"/>				
14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Les installations de la porcherie et les faces intérieures des stalles sont-elles lisses, sans jointures et simples à nettoyer ?			<input type="checkbox"/>				

Conduite de l'élevage – Check-list

N°	Expl.		Domaine: détention (suite)						
	EL	EN		Critères, questions		NP	E	PE	I
15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Les matériaux de construction utilisés sont-ils de bons isolants thermiques et phoniques et sont-ils imperméables à l'humidité et aux nuisibles ?		<input type="checkbox"/>				
16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Le sol de la porcherie est-il : • isolé ? • antidérapant, adhérant, mais pas trop rugueux pour les porcelets ? • non poreux et simple à nettoyer ?		<input type="checkbox"/>				
17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Les sols dans l'aire de repos correspondent-ils au besoin en chaleur des animaux ?		<input type="checkbox"/>				
18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Les abreuvoirs sont-ils adaptés, fonctionnels et montés à une hauteur adéquate ?		<input type="checkbox"/>				
19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	L'aire de repos est-elle sèche et à l'abri des courants ?		<input type="checkbox"/>				
20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Les box de mise bas sont-ils construits de manière à : • garantir une bonne vue d'ensemble ? • ne pas entraver l'aide à la mise bas, l'affouragement, l'évacuation du fumier, le nettoyage et la désinfection ? • minimiser les pertes de porcelets par écrasement ? • éviter que les truies ou les porcelets ne se blessent au contact des installations ?		<input type="checkbox"/>				
21	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Les auges et les automates à fourrage peuvent-ils être nettoyés ?		<input type="checkbox"/>				
22	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Les auges et les automates à fourrage sont-ils construits de manière à minimiser les pertes de fourrage ?		<input type="checkbox"/>				
23	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Les abreuvoirs et les conduites d'alimentation peuvent-ils être contrôlés facilement et de manière sûre ?		<input type="checkbox"/>				
24	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Le même système d'alimentation en eau est-il installé dans toutes les parties de l'exploitation ?		<input type="checkbox"/>				
25	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	La porcherie est-elle équipée d'une installation permettant au personnel de se nettoyer et de se désinfecter, ainsi que de porter des vêtements de travail propres à l'exploitation ?		<input type="checkbox"/>				
26	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Les truies d'élevage à inséminer ou portantes disposent-elles de suffisamment de lumière et de liberté de mouvement ?		<input type="checkbox"/>				

N°	Expl.		Domaine : alimentation						
	EL	EN	Critères, questions		NP	E	PE	I	M
1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	L'exploitant est-il conscient que le prix unitaire de deux aliments ou additifs n'est pas un élément de comparaison en soi, mais que ces grandeurs ne deviennent comparables qu'une fois associées à leurs teneurs en éléments nutritifs respectives ?		<input type="checkbox"/>				
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Le fournisseur d'aliment ou de prémix offre-t-il un soutien technique complet et compétent ?		<input type="checkbox"/>				
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	L'affouragement (composants, élaboration de la ration, aliments spéciaux) est-il discuté avec le conseiller en alimentation ?		<input type="checkbox"/>				
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Les aliments sont-ils stockés correctement et contrôlés régulièrement ?		<input type="checkbox"/>				
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Les différents aliments sont-ils irréprochables sur le plan microbiologique, c'est-à-dire exempts de germes nocifs tels que les levures, les moisissures et les bactéries ?		<input type="checkbox"/>				
6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Les silos sont-ils nettoyés et désinfectés au moins deux fois par an ?		<input type="checkbox"/>				
7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Les installations d'alimentation (trémie, cuve de stockage et de préparation, marmite, conduites) sont-elles régulièrement contrôlées, nettoyées et désinfectées ?		<input type="checkbox"/>				
8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Les aliments et sous-produits produits sur l'exploitation sont-ils régulièrement analysés (au moins la teneur en MS) et est-ce qu'un aliment complémentaire approprié est utilisé ?		<input type="checkbox"/>				
9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Un approvisionnement optimal des animaux est-il garanti en ce qui concerne les nutriments suivants : • énergie + protéines ; • minéraux et oligo-éléments ; • autres biorégulateurs.		<input type="checkbox"/>				
10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Est-il possible de peser les quantités de soupe préparées et les rations distribuées ?		<input type="checkbox"/>				
11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Les truies d'élevage sont-elles affourragées en tenant compte de leur état corporel ?		<input type="checkbox"/>				
12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	La quantité de fourrage distribué est-elle réduite après la saillie ?		<input type="checkbox"/>				
13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Les truies gestantes reçoivent-elles suffisamment de ballast ?		<input type="checkbox"/>				

Conduite de l'élevage – Check-list

N°	Expl.		Domaine: alimentation (suite)						
	EL	EN	Critères, questions		NP	E	PE	I	M
14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Utilisez-vous la méthode du « flushing » sur vos truies ?		<input type="checkbox"/>				
15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Les truies gestantes reçoivent-elles une quantité d'aliment (88 % MS) plus ou moins équivalente à 1 % de leur poids vif ?		<input type="checkbox"/>				
16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Effectuez-vous correctement la phase de transition pour les truies en fin gestation ?		<input type="checkbox"/>				
17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Les truies allaitantes reçoivent-elles une ration hautement concentrée et riche en énergie et cette ration est-elle distribuée quasi ad libitum aux truies avec de grandes portées ?		<input type="checkbox"/>				
18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	L'allaitement des porcelets surnuméraires par une mère adoptive est-il possible ?		<input type="checkbox"/>				
19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Accorde-t-on suffisamment d'attention à une alimentation adaptée au moment du sevrage des porcelets ?		<input type="checkbox"/>				
20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	L'alimentation par phase est-elle appliquée de manière conséquente ?		<input type="checkbox"/>				
21	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Les courbes de croissance et d'alimentation sont-elles adaptées à l'état des animaux (génétique, santé, appétence) ?		<input type="checkbox"/>				
22	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dans le cas d'un affouragement rationné des porcs à l'engrais, les animaux sont-ils affourragés au moins trois fois par jour ?		<input type="checkbox"/>				
23	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dans le cas d'un affouragement ad libitum automatisé, la fiabilité des automates est-elle garantie (réglage, gaspillage) ?		<input type="checkbox"/>				
24	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Accorde-t-on suffisamment d'attention à l'alimentation en eau des animaux ?		<input type="checkbox"/>				
25	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A titre préventif contre la diarrhée et la maladie de l'oedème (infection par <i>E. coli</i>), un pouvoir tampon suffisant du fourrage est-il assuré ?		<input type="checkbox"/>				
26	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Les truies allaitantes reçoivent-elles un supplément d'eau de boisson après les repas ?		<input type="checkbox"/>				
27	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	La teneur en acides gras polyinsaturés du fourrage prévient-elle le risque de déduction dû à un indice de graisse trop élevé ?		<input type="checkbox"/>				
28	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Des additifs contenant des biorégulateurs sont-ils utilisés en tant qu'alternative aux SPA (stimulateurs de performance antimicrobiens) ?		<input type="checkbox"/>				

N°	Expl.		Domaine : management						
	EL	EN	Critères, questions		NP	E	PE	I	M
1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Les chambres sont-elles préparées de manière optimale avant l'arrivée des animaux ? • nettoyage et désinfection ? • vidange et nettoyage des canaux ? • suffisamment de temps pour le séchage ? • préchauffage en hiver ?		<input type="checkbox"/>				
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	En hiver l'eau des abreuvoirs est-elle tempérée ?		<input type="checkbox"/>				
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Les systèmes d'alimentation liquide sont-ils soumis à un programme d'hygiène conséquent et adapté ?		<input type="checkbox"/>				
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Une lutte contre les souris et les moineaux a-t-elle été mise en place ?		<input type="checkbox"/>				
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Les invasions de mouches sont-elles combattues aussi bien à titre préventif que curatif ?		<input type="checkbox"/>				
6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Une pharmacie contenant les médicaments et les produits auxiliaires les plus importants est-elle à disposition ?		<input type="checkbox"/>				
7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Les interventions sur les animaux ainsi que l'utilisation des médicaments vétérinaires sont-elles consignées dans un journal des traitements ?		<input type="checkbox"/>				
8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Une bonne surveillance des animaux (consistance des déjections, température, pH de l'urine, etc.) est-elle effectuée lors des phases critiques de la production (mise bas, sevrage, changement d'alimentation ou de box) ?		<input type="checkbox"/>				
9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lors de pertes d'animaux, essaie-t-on d'en déterminer les causes et d'en tirer des conclusions ?		<input type="checkbox"/>				
10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lors de problèmes de santé ou de maladies, les observations concernant la consommation d'aliments et le comportement général des animaux sont-elles consignées ?		<input type="checkbox"/>				
11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Un plan de rotation et un programme d'hygiène sont-ils appliqués de manière conséquente sur l'exploitation ?		<input type="checkbox"/>				
12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Les animaux sont-ils observés attentivement une à deux fois par jour, les éventuels changements par rapport au comportement normal sont-ils interprétés correctement et des mesures adéquates sont-elles prises ?		<input type="checkbox"/>				
13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Les mesures particulières sont-elles consignées, et le reste du personnel en est-il informé ?		<input type="checkbox"/>				
14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Une balance est-elle disponible pour effectuer des pesées de contrôle ?		<input type="checkbox"/>				
15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Les porcs ne sont pas juste annoncés à la vente, mais leur vente est le résultat de négociations et ils sont contrôlés à l'abattoir ?		<input type="checkbox"/>				
16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Les employés, auxiliaires et remplaçants disposent-ils des connaissances techniques, du savoir-faire et d'une motivation suffisante ?		<input type="checkbox"/>				
17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	La commercialisation a-t-elle lieu de manière claire et transparente ?		<input type="checkbox"/>				
18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Les informations, ainsi que les services des organisations officielles telles que le centre de testage MLP, SUISAG, Suisseporcs, etc. sont-ils utilisés ?		<input type="checkbox"/>				

Conduite de l'élevage – Check-list

N°	Expl.		Domaine: management (suite)					
	EL	EN	Critères, questions		NP	E	PE	I
19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Est-ce que le montant des divers postes des coûts directs sont connus ? <ul style="list-style-type: none">• achat des porcelets;• alimentation;• vétérinaire, médicaments vétérinaires;• etc.	<input type="checkbox"/>				
20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Est-ce que le montant des divers postes des coûts de structure sont connus ? <ul style="list-style-type: none">• bâtiments, installations, matériel courant;• employés, assurances, intérêts;• etc.	<input type="checkbox"/>				
21	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Les résultats technico-économiques sont-ils comparés avec ceux d'autres exploitations ?	<input type="checkbox"/>				
22	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Les truies sont-elles lavées et désinfectées avant leur transfert dans les box de mise bas ?	<input type="checkbox"/>				
23	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Les truies et plus particulièrement les nullipares sont-elles vermifugées une semaine avant leur transfert dans les box de mise bas ?	<input type="checkbox"/>				
24	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Les verrats et les remontes sont-ils vermifugés au moins deux fois par an ?	<input type="checkbox"/>				
25	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Une surveillance des mises bas a-t-elle lieu de manière systématique ?	<input type="checkbox"/>				
26	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Les porcelets reçoivent-ils un apport en fer lors de leurs premiers jours de vie ?	<input type="checkbox"/>				
27	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Les animaux d'élevage proviennent-ils d'une exploitation avec le statut AR ?	<input type="checkbox"/>				
28	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaillez-vous avec un registre des saillies, des retours en chaleur, des accouplements et des naissances ?	<input type="checkbox"/>				
29	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Les truies inséminées sont-elles contrôlées 4 à 5 semaines après l'insémination à l'aide d'un appareil de diagnostic de gestation ?	<input type="checkbox"/>				
30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Les animaux d'élevage sont-ils achetés après un examen sérieux de leur ascendance et de leurs performances (valeurs d'élevage).	<input type="checkbox"/>				
31	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Une vérification de l'état de santé des animaux de l'exploitation de départ a-t-elle lieu avant l'achat d'animaux d'élevage (MMA, maladie de l'oedème, rouget, diarrhée, etc.) ?	<input type="checkbox"/>				
32	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	L'IA est-elle utilisée afin de garantir un apport de sang neuf ?	<input type="checkbox"/>				
33	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Consultez-vous régulièrement une check-list pour le déroulement des tâches en élevage ? <ul style="list-style-type: none">• présélection des porcelets pour les épreuves sur le terrain;• sélection sur la base des résultats de testage et si possible des décomptes d'abattage;• plans d'accouplement basés sur l'ascendance et les performances des reproducteurs.• subdivision du cheptel en fonction des performances des différents groupes:<ul style="list-style-type: none">– troupeau d'élite pour la production de remontes;– truies pour la production de porcelets d'engraissement.• structure d'âge à l'intérieur du cheptel de truies;• plan de rotation.	<input type="checkbox"/>				

N°	Expl.		Domaine : management (suite)							
	EL	EN	Critères, questions			NP	E	PE	I	M
34	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	La formation des groupes de truies gestantes a-t-elle lieu soit le jour du sevrage, soit 21 jours après la date de saillie (en aucun cas durant les 21 jours qui suivent la saillie à cause de la nidification) ?			<input type="checkbox"/>				
35	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lors de l'achat des porcelets d'engraissement (gorets), prête-t-on suffisamment attention à leur provenance ?			<input type="checkbox"/>				
36	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Les gorets achetés sont-ils répartis dans les différents box en fonction de l'exploitation de provenance, du poids vif et du type d'affouragement précédent ?			<input type="checkbox"/>				
37	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Les gorets sont-ils regroupés par sexe et affourragés de manière différenciée ?			<input type="checkbox"/>				
38	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	La taille des groupes (nombre d'animaux par box) est-elle déterminée de manière à optimiser les performances des animaux, ainsi que les coûts de construction ?			<input type="checkbox"/>				
39	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	L'utilisation des chambres est-elle, dans la mesure du possible, gérée selon le principe « tout dedans, tout dehors » ?			<input type="checkbox"/>				
40	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Les animaux sont-ils abattus lorsqu'ils ont atteint le poids idéal de 100 – 110 kg ?			<input type="checkbox"/>				
41	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Est-ce qu'une mise en valeur des résultats techniques de l'engraissement est effectuée ? • ration journalière par animal ; • gain moyen quotidien par animal ; • indice de consommation (kg de fourrage resp. MJ EDP par kg d'accroissement) ; • qualité des carcasses.			<input type="checkbox"/>				
42	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Entretenez-vous des contacts réguliers avec d'autres producteurs, afin de favoriser les échanges d'expériences (discussions, visites d'exploitations) ?			<input type="checkbox"/>				

Conduite de l'élevage – Check-list

N°	Expl.		Domaine: élevage						
	EL	EN	Critères, questions		NP	E	PE	I	M
1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Les verrats sont-ils en bonne condition (état corporel) ?		<input type="checkbox"/>				
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lors de la constitution du cheptel : la race, les buts d'élevage et les éventuels croisements s'inscrivent-ils dans une stratégie d'élevage claire ?		<input type="checkbox"/>				
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lors de la sélection : l'ascendance, les lignées paternelles et maternelles, les valeurs d'élevage, les performances d'engraissement et d'abattage, ainsi que leur sécurité respective sont-elles suffisamment prises en compte ?		<input type="checkbox"/>				
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Les remontes d'élevage sont-elles inséminées à un poids vif de 120 – 130 kg et un âge compris entre 210 et 240 jours ?		<input type="checkbox"/>				
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Une mise en valeur des résultats techniques de l'élevage est-elle effectuée ? • poids à la naissance et au sevrage ; • nombre de porcelets nés vivants et nombre de porcelets sevrés par truite par année.		<input type="checkbox"/>				
6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Accorde-t-on suffisamment d'importance à la structure d'âge du cheptel en rapport avec les performances (autant de truites que possible entre la troisième et la septième portée) ?		<input type="checkbox"/>				
7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Essaie-t-on d'optimiser les performances du cheptel dans son ensemble et pas seulement au niveau de l'animal ?		<input type="checkbox"/>				
8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	L'amélioration de la performance de reproduction passe-t-elle par les croisements et par la sélection sur la VER (valeur d'élevage reproduction) (en particulier chez les verrats) ?		<input type="checkbox"/>				
9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Accorde-t-on suffisamment d'attention à la détection des chaleurs et s'efforce-t-on d'inséminer au moment optimal ?		<input type="checkbox"/>				
10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Des mesures stimulant le déclenchement des chaleurs sont-elles utilisées ? • contact avec le verrat ; • modification du système de détention ; • modification de la ration (flushing).		<input type="checkbox"/>				
11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	La détection et la stimulation des chaleurs ont-elles lieu à l'aide d'un verrat ?		<input type="checkbox"/>				
12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Evite-t-on de surcharger le verrat ? • au maximum 4 – 6 saillies par semaine ; • tenir compte de l'âge ainsi que de l'état corporel du verrat et planifier des périodes de repos entre les phases de saillies ?		<input type="checkbox"/>				
13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A-t-on recours à l'IA en plus du verrat ?		<input type="checkbox"/>				
14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Les prélèvements de semence et les IA sont-ils effectués de manière appropriée ?		<input type="checkbox"/>				
15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Des doubles inséminations sont-elles pratiquées lorsque cela est possible ?		<input type="checkbox"/>				
16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	L'état corporel des truites correspond-il à celui d'animaux d'élevage et pas à celui d'animaux d'engraissement ?		<input type="checkbox"/>				
17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Un diagnostic de gestation est-il effectué systématiquement à l'aide d'un appareil à ultrasons ?		<input type="checkbox"/>				
18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	En cas de retours en chaleur et de truites non portantes essaie-t-on d'en déterminer les causes et d'en tirer des conclusions ?		<input type="checkbox"/>				
19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Le poids moyen des porcelets à la naissance se situe-t-il en-dessus de 1,4 kg ?		<input type="checkbox"/>				

N°	Expl.		Domaine : élevage (suite)						
	EL	EN	Critères, questions		NP	E	PE	I	M
20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lors de portées irrégulières, les porcelets sont-ils répartis judicieusement entre les différentes truies ?		<input type="checkbox"/>				
21	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Administre-t-on aux porcelets nouveau-nés des vitamines, du fer et des bactéries lactiques ?		<input type="checkbox"/>				
22	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Est-ce qu'un programme de vaccination préventif contre les troubles infectieux de la fécondité (parvovirose, rouget, SMEDI) et contre les maladies infectieuses des porcelets sous la mère (colibacillose, entérite à rotavirus) est mis en place ?		<input type="checkbox"/>				
23	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Est-ce qu'une immunisation naturelle contre des maladies infectieuses telles que la parvovirose, les entéroviroses, la colibacillose a lieu à l'aide d'une soupe de contact ? Les jeunes truies sont-elles en contact avec les truies plus âgées ?		<input type="checkbox"/>				
24	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Est-ce que l'alimentation au moment de la mise bas permet de prévenir les constipations et le syndrome MMA ?		<input type="checkbox"/>				
25	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lors d'infections répétées avec <i>E. coli</i> , la sélection s'oriente-t-elle vers des animaux d'élevage résistants (génotype AA) ?		<input type="checkbox"/>				
26	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lorsque la fréquence des troubles de la fécondité suivants augmente, les causes sont-elles tout de suite recherchées et des mesures appropriées sont-elles prises ? <ul style="list-style-type: none">• absence de chaleurs (détention, alimentation, stimulation);• fausses chaleurs (moisissures dans les fourrages, autres);• retours en chaleur (verrat, moment de l'insémination, alimentation, toxines);• avortement (infection, intoxication alimentaire);• signes extérieurs de gestation (toxines dans le fourrage, infection);• petites portées (verrat, moment de l'insémination, alimentation);• libido insuffisante du verrat.		<input type="checkbox"/>				
27	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Des mesures préventives sont-elles prises en cas de diarrhée et de maladie de l'œdème ? <ul style="list-style-type: none">• éviter le stress chez les animaux (conditions de détention optimales);• utilisation d'aliments diététiques (acidification, teneur en protéines réduite, biorégulateurs).		<input type="checkbox"/>				
28	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lorsque des cas de diarrhée apparaissent, les causes sont-elles recherchées et des mesures immédiates sont-elles prises ? <ul style="list-style-type: none">• détermination du génotype de <i>E. coli</i> impliqué;• diarrhée des nouveau-nés (soupe de contact, traitement par voie orale);• diarrhée après 3 - 4 semaines de vie (soupe de contact, aliment diététique);• diarrhée après le sevrage (éviter le stress, aliment diététique);• diarrhée après un changement de box (éviter le stress).		<input type="checkbox"/>				
29	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	La perte de poids des truies entre la fin de la gestation et le sevrage (due à la mise bas et à l'allaitement) est-elle au maximum de 30 – 40 kg ?		<input type="checkbox"/>				
30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	La consommation des porcelets âgés de 5 à 6 semaines représente-t-elle au moins 400 g par animal et par jour ?		<input type="checkbox"/>				
31	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Une moyenne de 2.2 à 2.3 portées par truie et par année est-elle atteinte ?		<input type="checkbox"/>				
32	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Les animaux provenant de portées présentant des tares héréditaires sont-ils exclus de la sélection ?		<input type="checkbox"/>				
33	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Accorde-t-on suffisamment d'importance à la conformation des animaux (aplombs, mamelles) ?		<input type="checkbox"/>				